



***Eurypyga helias*** (43-48 cm)  
Tonrillo  
En bosques húmedos, con frecuencia en pequeños ríos de la Amazonía. Esbelta, de cuello largo, tiene el pico anaranjado con la base negra y de patas largas.



***Ardea cocoi*** (127 cm)  
Garga Agut  
En humedales salados y de agua dulce. Garga de mayor tamaño en Perú. Solitaria o en pequeños grupos. Se alimenta de invertebrados pequeños, peces, reptiles y anfibios.



***Psarocolius angustifrons***  
(48 cm machos-36 cm hembras)  
Poucar grande  
toda la Amazonía. La sub especie nominal que vive en tierras bajas tiene el pico negro, mientras que las sub especies de tierra altas tienen el pico claro.



***Momotus momota*** (41 cm)  
Relojero de corona agul  
De poco a bastante común en bosques húmedos de la Amazonía. Es territorial y permanece quieto por largos periodos. Anida en la copa de los árboles.



***Ortalis guttata*** (52 cm)  
Manacaraca/Chocholaca jaspeada  
Ampliamente distribuida y bastante común en el oriente de Perú. Posee una reducida carnosidad en la garganta. Se observa generalmente en grupos, no vuela tramos largos, sino de rama en rama, de árbol en árbol.



***Trogon collaris*** (25 cm)  
Trogon  
Poco común en bosques húmedos. Marcada diferencia entre machos y hembras. Generalmente se cuelgan verticalmente y permanecen inmóviles. Se alimentan de insectos y frutas.



***Ramphastus lucanus*** (53-57cm)  
Tucán de garganta blanca  
Común en el estrato medio y superior de la vegetación amazónica. La hembra posee un pico más corto que el macho. Se alimentan de frutos, flores néctar y animales pequeños.



***Anhima cornuta*** (84-91 cm)  
Camungo  
Habita al borde de ríos y pantanos, usualmente en parejas o solos. Vuela muy bien y puede planear. Tiene en la cabeza una pluma larga, blanca y modificada de consistencia córnea.

Leyenda:  
Nombre Científico (medidas)  
Nombre común

